



Istituto Comprensivo Statale
"ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA www.calvinovillaricca.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it – calvinovillaricca@virgilio.it; tel.-fax 081/818.16.85

Prot. n. 4341

Villaricca, 11 ottobre 2017

Ai genitori degli alunni I.C.
Al personale docente I.C.
All'Albo on line
Agli Atti

Oggetto: Misure di profilassi per il controllo della **pediculosi nelle scuole**. A. sc. 2017-2018

In presenza di casi di pediculosi, la Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 3 marzo 1998 prevede, per il soggetto colpito, l'isolamento da contatto per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante. Pertanto, se ne può disporre la riammissione alla frequenza scolastica solo dopo l'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante.

Si ritiene opportuno rendere note le misure di profilassi per il **controllo della pediculosi nelle scuole**.

Per affrontare in maniera efficace il problema delle infestazioni da pidocchi nella scuola è necessario il contributo di genitori, insegnanti e personale sanitario. Ognuno deve svolgere il suo compito in maniera coordinata ed efficiente.

- Ai **genitori** dei bambini che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.
- L'**insegnante** che nota segni di infestazione sul singolo bambino ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi al dirigente scolastico.
- Il **dirigente scolastico** deve disporre l'allontanamento obbligatorio del bambino e inviare ai genitori una lettera in cui è richiesto un certificato medico di avvenuto trattamento ai fini della riammissione a scuola.
- Il **personale sanitario della ASL** è responsabile per l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione in tema di prevenzione.
- Il **medico curante** (Pediatra o medico di famiglia) ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l'inizio del trattamento per la riammissione a scuola.

In considerazione dell'incremento del numero di casi di pediculosi si raccomanda a ciascuno, per quanto di competenza, di **attenersi scrupolosamente alle indicazioni** riportate nella presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Raffaele RUGGIERO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co.2 del D.lgs

Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica

PEDICULOSI - FTIRIASI ICD-9 132 - 132.9

Classe di notifica: IV

Periodo di incubazione

In condizioni ottimali per il ciclo vitale dei pidocchi, da 6 a 10 giorni in caso di infestazione con uova.

Periodo di contagiosità

Fintanto che uova, forme larvali o adulte sono presenti e vitali sulle persone infestate o su indumenti ed altri *fomites*.

Provvedimenti nei confronti del malato

In caso di infestazione da ***P. humanus corporis*** isolamento da contatto per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante. Il trattamento disinfestante consiste nell'applicazione di polvere di talco contenente DDT al 10% oppure Malathion all'1% oppure permetrina allo 0,5% o altri insetticidi.

Gli indumenti vanno trattati con gli stessi composti applicati sulle superfici interne oppure lavati con acqua bollente.

In caso di infestazioni da ***P. humanus capitis***, restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante.

Il trattamento disinfestante, consistente in applicazione di shampoo medicati contenenti permetrina all'1% o piretrine associate a piperonil-butossido, o benzilbenzoato o altri insetticidi, deve essere periodicamente ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno un mese.

Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario.

In caso di infestazioni da ***Phthirus pubis*** le zone interessate vanno rasate; i trattamenti disinfestanti sono simili a quelli da adottare per il *P. humanus capitis* e, se non sufficienti, vanno ripetuti dopo 4-7 giorni di intervallo.

Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti

Sorveglianza sanitaria per l'identificazione di altri casi di parassitosi, e conseguente trattamento disinfestante.

I compagni di letto ed i partners sessuali di soggetti infestati da *P. pubis* devono essere trattati in via profilattica con gli stessi prodotti impiegati per i casi di infestazione conclamata.